



Traitements curatifs

Traitements de confort

Phase curative

Phase
palliative

Phase
terminale

Deuil

Cheminement psychologique

**D
I
A
G
N
O
S
T
I
C**

Dénégation

Colère

Marchandage

Dépression

Acceptation

**M
O
R
T

A
G
O
N
I
E**

indice de Karnofsky

- **100 % Normal, aucune plainte, aucun signe ou symptôme de maladie**
- **90 % Capable de réaliser les activités normales de la vie quotidienne, symptômes ou signes mineurs de la maladie**
- **80 % Capable de réaliser les activités normales de la vie quotidienne avec effort, quelques symptômes ou signes mineurs**
- **70 % Capable de se prendre en charge, incapable de mener une activité normale ou de travailler**
- **60 % Nécessite une aide occasionnelle, mais peut prendre en charge la plupart de ses soins personnels**
- **50 % Nécessite une aide suivie et des soins médicaux fréquents**
- **40 % Handicapé, nécessite une aide et des soins particuliers**
- **30 % Sévèrement handicapé, l'hospitalisation est indiquée, bien que la mort ne soit pas imminente**
- **20 % Hospitalisation nécessaire, très malade, nécessite un traitement de soutien actif**
- **10 % Moribond, processus fatal progressant rapidement**